


CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATETR informovaný souhlas

Štítek s údaji o pacientovi



➤ **Vážená pacientko, vážený paciente**

Z důvodu Vašeho onemocnění je nutné zavedení tzv. centrálního žilního katetru.

➤ **Proč je tento zákrok nutný?**

Zavedení centrálního žilního katetru je nutné z některých následujících důvodů:

- nutnost podání koncentrovaných roztoků výživy nebo některých léků, jejichž podání do povrchových žil by vedlo k místním zánětům
- nutnost podání většího množství tekutin
- měření žilního tlaku jako součást vyšetřování a léčby
- nutnost zavedení dočasné srdeční stimulace
- nutnost hemodialýzy (umělé ledviny) při selhání ledvin
- nedostupnost nebo opakované záněty povrchových žil

➤ **Provedení výkonu**

Na našem pracovišti se nejčastěji kanylují:

- vnitřní jugulární žíly probíhající po obou stranách krku, bočně od štítné chrupavky.
- vnitřní podklíčkové žíly probíhající oboustranně za klíční kostí. Punkce se provádí z přístupu nad, nebo častěji pod klíční kostí.
- zcela výjimečně vnitřní stehenní žíly probíhající v hloubi stehenního svalu a v tříselech.

Výkon se provádí za sterilních podmínek v místním znecitlivění punkční jehlou, jejímž průsvitem se do žíly zavádí speciální vodič (drát) s nesmáčivým povrchem. Po tomto vodiči se po vytažení jehly zavádí katetr (cévka), který svou delší částí zůstává v žíle a kratší část je dvěma stehy fixována ke kůži. Výkon je ukončen opět dezinfekcí a sterilním krytím náplastí. Po výkonu je provedeno rentgenologické vyšetření k ozřejnění polohy katetru v žilním řečišti a k vyloučení komplikací.

➤ Možná rizika a komplikace

I tento běžný a rutinně prováděný výkon může být v malém procentu případů provázen komplikacemi. K nim patří:

- Vniknutí vzduchu do dutiny hrudní (tzv. pneumothorax) vzniká při poranění plicí punkční jehlou. Častěji bývají postiženi nemocní s chronickým zánětem průdušek a nemocní, u nichž je punkce obtížná. Pneumothorax se léčí hrudní drenáží.
- Krvácení vzniká v důsledku poranění tepny nebo v důsledku poruch krevní srážlivosti. V naprosté většině případů se jedná o krvácení nezávažné, které lze léčit kompresí místa vpichu, nebo jeho ledováním. Jen v extrémně vzácných případech je nutné ošetření chirurgem.
- Poruchy srdečního rytmu jsou prakticky vždy přechodné a nezávažné a nevyžadují žádnou léčbu.
- Poranění nervů, většinou inervujících svaly horních končetin, může vyústit v přechodnou krátkodobou slabost těchto svalů.
- Vznik klinicky závažných krevních sraženin, vyplňujících celou cévu je extrémně vzácný. Léčí se léky ředícími krev.
- Infekce se projevuje vzestupem teplot, zimnicí a třesavkou. Je důvodem okamžitého odstranění kateru a v některých případech nasazení antibiotik.

Alternativou je kanylace periferních žil, obvykle na pažích. Přes kanyly v periferních žilách ale není možné podávat některé léky, které jsou pro Vaši léčbu nutné. V případě, že nelze z anatomických důvodů periferní žíly kanylovat, neexistuje odpovídající alternativa k centrálnímu katetru.

➤ Na co je třeba dbát?

V průběhu výkonu je důležité, abyste ležel/a klidně na lůžku, nepohyboval/a jste se a nedotýkal/a se sterilně zakrytých míst. Během celého výkonu můžete s lékařem bez omezení hovořit. Po odstranění katetru nebudete dále ve svém běžném životě omezen/a.

➤ Souhlas s výkonem

Já níže podepsaný pacient /zák. zástupce/, tímto prohlašuji, že mě lékař náležitě a srozumitelně informoval a vysvětlil důvod lékařského výkonu, informoval mě o mé

diagnóze a způsobu léčby a to takovým způsobem, který je podle mého soudu pro mě srozumitelný. Vysvětlení jsem plně pochopil/a a vzal/a na vědomí. Zároveň stvrzuji, že jsem podal/a pravdivé informace o svém zdravotním stavu. Nezamlčel/a jsem žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na léčbu.

Informující lékař mě seznámil s možnými alternativami. Byl/a jsem též informován o možných rizicích a komplikacích tohoto výkonu. Dále mne informující lékař seznámil s předpokládanou úspěšností výkonu a byl/a jsem informován/a o možných problémech během uzdravování, i jaký vliv bude mít výkon na moji schopnost, či další způsob života. **Rozumím informacím, které mi lékař vysvětlil.** Měl/a jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy a pokud tomu tak bylo, veškeré dotazy mi byly zodpovězeny a nemám další otázky.

Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony, nutné k záchraně mého života nebo zdraví.

Na základě tohoto poučení dávám **svůj plný informovaný souhlas** s uvedeným lékařským výkonem, což stvrzuji svým vlastno ručním podpisem.

Podpis pacienta/zák. zástupce pacienta:

Datum a čas: _____

➤ Prostor pro doplňující údaje:

Prohlašuji, že jsem pacienta (zákonného zástupce) osobně informoval, poučil a podal náležitě vysvětlení o skutečnostech uvedených v tomto písemném informovaném souhlasu a pacient (zákonný zástupce) vyslovil svůj informovaný souhlas

Podpis a razítko lékaře/datum a čas:
