

## Pokyny před odběrem krve na vyšetření agregace trombocytů

Vážení rodiče / Vážení zákonní zástupci,

*ošetřující lékař vašeho dítěte požaduje vyšetření funkčních vlastností krevních destiček, které je značně ovlivněno celou řadou faktorů. Z toho důvodu prosíme o pečlivé vyplnění a dodržení následujících pokynů, které mohou významně ovlivnit výsledek vyšetření.*

Jméno a příjmení dítěte: .....

Rodné číslo dítěte: .....

Podpis rodiče / zákonného zástupce:

### Pravidelně užívám:

- Antiagregační léčba:
- Kyselina acetylsalicylová (např. Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Stacyl, Aggrenox, Vasopirin)
- Clopidogrel (Plavix, Trombex, Plavocorin, Platel, Zyllt)
- Ticagrelor (Brilique)
- Prasugrel (Effient)
- Ticlopidin (Apo-Tic, Tagren)
- Cilostazol (Cilostazol Stada)
- Jiná.....
- Antikoagulační léčba (Warfarin, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana, Clexane, Fraxiparine, Zibor)
- Antidepresiva – jaká .....

**Kouříte?**       ANO                               NE

Pokud v době **deseti dnů** před vyšetřením budete potřebovat tlumit bolest nebo teplotu, užíjte přípravky s obsahem paracetamolu (Paralen, Panadol, Paramax, ...), pokud není ve Vašem případě kontraindikován. Na bolest či teplotu neužívejte léčiva s obsahem kyseliny acetylsalicylové (Acylpyrin, Superpyrin, Aspirin, Aspro...), mefenamové kyseliny ani nesteroidní antirevmatika (Ibuprofen, Ibalgin, Diclofenac, Voltaren, Naproxen...). Také vysadte přípravky z bylin a potravinové doplňky s obsahem C a E vitamínu a s obsahem výtažků z Ginkgo biloba (Tebokan a další).

**1 den před vyšetřením doporučujeme vyvarovat se:** pití alkoholu, většího množství kávy, silného černého čaje, konzumace česneku, cibule, zázvoru, tučných jídel včetně tučných ryb, většího množství kurkumy, pískavice, římského kmínu větší fyzické zátěže.

Pokud se u vašeho dítěte nepodařilo dodržet všechny pokyny před odběrem, napište které:

.....  
.....

**K odběru přiveďte dítě na lačno!**