


F-181

**Žádanka na monitorování hladin léčiv**

Klinický farmaceut Mgr. Zuzana Vašířová, kontakt: 312 606 547

Kód ZP		IČP		Odbornost		 <p><b>Oblastní nemocnice Kladno, a.s.</b> Vančurova 1548, 272 59 Kladno IČO: 27256537</p> <p><b>Klinická laboratoř</b> centrální příjem tel: 312 606 246 imunochemická laboratoř tel: 312 606 571</p>	
Číslo pojištěnce		Pacient (příjmení, jméno, titul)					
Základní dg.		Ostatní dg.		Sex			
Výška (cm)		Váha (kg)					
Oddělení (stanice)		Lékař (razítko, podpis)		Telefon		STATIM	
						Odběr provedl	
						Vzorek zkontroloval	
<b>Důvod vyšetření:</b>				<b>Laboratorní hodnoty:</b>			
První vyšetření				Kreatinin (μmol/l)			
Opakované vyšetření							
<b>Lék:</b>				<b>Způsob aplikace</b>			
Gentamicin				infuze – délka ..... hodin			
Vankomycin				i. m.			
				i. v.			
				p.o.			
<b>Datum odběru vzorku</b>							
Odběr vzorku před podáním léku v ..... hodin							
Lék podán v (u infuze začátek podání) ..... hodin							
Odběr vzorku po podání léku v ..... hodin							
<b>Dávkový režim</b>							
Datum	Čas podání	Pořadí dávky	Dávka (mg)	Interval (hodiny)			
Další léčba pacienta, etiologické agens, poznámky:							

**Odběr biologického materiálu na stanovení koncentrace antibiotik  
– manuál pro zdravotnické pracovníky**

<b>Gentamicin</b> (GENTAMICIN LEK 80mg/2 ml inj.sol., B-Braun 1mg/ml = 80mg/80ml, 3mg/ml = 240mg/80ml)		
<b>Odběrová zkumavka</b>	zkumavka Sarstedt, hnědý uzávěr	
<b>Odběr</b>	Ustálený stav	doporučujeme provést odběr dle režimu podávání: - frakcionované (denní dávka rozdělena do více dávek) - odběr 1. – 2. den (3. dávka) - jednou denně (denní dávka v jedné dávce) – odběr 2. den
	Místo odběru	periferní žíla (z jiného místa, než bylo antibiotikum aplikováno)
	Před podáním dávky	0 – 30 minut
	Po podání dávky	30 minut po ukončení infuze 1 hodinu po podání i. m.
	Hemodialýza	3 odběry – před HD, po HD a po podání antibiotika
<b>Podmínky přepravy</b>	ihned po odběru doručit na centrální příjem Klinické laboratoře spolu s vyplněnou <i>žádankou na klinicko-farmakologické vyšetření při léčbě antibiotiky</i>	

<b>Vankomycin</b> (VANCOMYCIN 500mg inf. plv., 1000mg inf. plv.)		
<b>Odběrová zkumavka</b>	zkumavka Sarstedt, hnědý uzávěr	
<b>Odběr</b>	Ustálený stav	doporučujeme provést odběr po 4. dávce
	Místo odběru	periferní žíla (z jiného místa, než bylo antibiotikum aplikováno)
	Před podáním dávky	0 – 30 minut
	Po podání dávky	30 minut po ukončení infuze
	Hemodialýza	3 odběry – před HD, po HD a po podání antibiotika
<b>Podmínky přepravy</b>	ihned po odběru doručit na centrální příjem Klinické laboratoře spolu s vyplněnou <i>žádankou na klinicko-farmakologické vyšetření při léčbě antibiotiky</i>	

**Kontakty:**

Klinický farmaceut Mgr. Zuzana Vašířová, tel: 312 606 547

Klinická laboratoř - Mgr. Marie Pavlisová, tel: 312 606 247