

## Pokyny před odběrem krve na vyšetření agregace trombocytů

Vážená paní / Vážený pane,

Váš ošetřující lékař požaduje vyšetření funkčních vlastností krevních destiček, které je značně ovlivněno celou řadou faktorů. Z toho důvodu prosíme o pečlivé vyplnění a dodržení následujících pokynů, které mohou významně ovlivnit výsledek vyšetření.

Jméno a příjmení: .....

Rodné číslo: .....

Podpis pacienta:

### Pravidelně užívám:

- Antiagregační léčba:
- Kyselina acetylosalicylová (např. Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Stacyl, Aggrenox, Vasopirin)
- Clopidogrel (Plavix, Trombex, Plavocorin, Platel, Zyllt)
- Ticagrelor (Brilique)
- Prasugrel (Effient)
- Ticlopidin (Apo-Tic, Tagren)
- Cilostazol (Cilostazol Stada)
- Jiná.....
- Antikoagulační léčba (Warfarin, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana, Clexane, Fraxiparine, Zibor)
- Antidepresiva – jaká .....

Kouříte?       ANO                       NE

### Pokyny před odběrem krve:

Pokud v době **deseti dnů** před vyšetřením budete potřebovat tlumit bolest nebo teplotu, užívejte přípravky s obsahem paracetamolu (Paralen, Panadol, Paramax, ...), pokud není ve Vašem případě kontraindikován. Na bolest či teplotu neužívejte léčiva s obsahem kyseliny acetylsalicylové (Acylpyrin, Superpyrin, Aspirin, Aspro...), mefenamové kyseliny ani nesteroidní antirevmatika (Ibuprofen, Ibalgin, Diclofenac, Voltaren, Naproxen...). Také vysadte přípravky z bylin a potravinové doplňky s obsahem C a E vitamínu a s obsahem výtažků z Ginkgo biloba (Tebokan a další).

**1 den před vyšetřením doporučujeme vyvarovat se:** pití alkoholu, většího množství kávy, silného černého čaje, konzumace česneku, cibule, zázvoru, tučných jídel včetně tučných ryb, většího množství kurkumy, pískavice, římského kmínu, větší fyzické zátěže.

Pokud se Vám nepodařilo dodržet všechny pokyny před odběrem, napište které:

.....  
.....

**K odběru se dostavte na lačno!**